AVERTISSEMENTS AGRICOLES DLP 14-6-71 1878

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS **AGRICOLES**

PUBLICATION PÉRIODIQUE =

ÉDITION DE LA STATION DE LA RÉGION PARISIENNE

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

PARIS, HAUTS DE SEINE, SEINE ST DENIS, VAL DE MARNE, ESSONNE, VAL D'OISE, YVELINES, SEINE ET MARNE

RÉGISSEUR RECETTES-AVANCE - D.D.A. PROTECTION DES VÉGÉTAUX, 47 Av. Paul-Doumer, (93) MONTREUIL-s-BOIS - 287 76-71 C. C. P. PARIS 9063-96

10 JUIN 1971.

BULLETIN Nº 129 Supplément nº 1

TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER.

CULTURES FRUITIERES

Les contaminations primaires par ascospores ne sont plus guère à craindre que dans les vergers fortement attaqués en 1970. La sortie de taches se termine. Dans les plantations en bon état sanitaire l'année dernière, où aucune tache de tavelure existe, la partie est donc pratiquement gagnée. Il n'en est pas de même dans les autres cas où la protection devra être assurée jusqu'à la récolte.

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES.

Depuis fin mai, la situation a été la suivante : activité assez intense du 30 mai au 4 juin, arrêt presque total ensuite, puis reprise depuis deux - trois jours. Dans tous les secteurs chauds les pontes déposées au cours de la période 30 mai-4 juin écloront au cours de la semaine du 14 au 20. De nouvelles éclosions devraient débuter entre le 20 et le 25.

Dans les secteurs froids, les sorties de papillons sont encore peu abondantes, les pontes peu nombreuses. Les premières éclosions n'auront finalement lieu qu'en fin de semaine prochaine. Un traitement avant cette période ne semble devoir intéresser que les vergers généralement très infestés. Dans les autres vergers, la protection pourra être retardée au moins jusqu'au début de la semaine du 20 au 27 juin.

DIVERS.

- ACARIENS: on trouve surtout des oeufs, des larves, des nymphes. N'intervenir que si la population le justifie.
- CARPOCAPSE DES PRUNES : les sorties se terminent, la protection doit être maintenue.
- PSYLLES: adultes et larves en nombre variable.
- DIDYMELLA DU FRAMBOISIER : les contaminations sont toujours possibles.

CULTURES LEGUMIERES

- TEIGNE DU POIREAU : le vol se poursuit; les pontes sont encore faibles.
- THRIPS DU POIREAU : dégâts notables dans certaines cultures; les produits recommandés contre la Teigne sont efficaces contre ce ravageur.
- MOUCHE DU CHOU : le vol continue.
- MOUCHE DE L'ASPERGE CRIOCERES : des adultes de mouches étaient encore visibles vers le 5 juin; tous les stades de Criocère sont représentés.

GRANDES CULTURES

- MILDIOU DE LA POMME DE TERRE : à notre connaissance des taches n'existent, les tas de déchets exceptés, que dans une seule culture. Les conditions climatiques ont pu être favorables aux contaminations localement les 6 et 9 juin; elles risquent de l'être plus généralement avec les orages d'hier et la pluie d'aujourd'hui. La protection devra être assurée au plus tard au début de la semaine prochaine.
- CONCOURS MILDIOU : le concours reste ouvert. Surveiller les cultures à partir du 16-17 juin.
- DORYPHORE : Intervenir quand les larves ont la taille d'un grain de blé.
- ERRATUM : Bulletin du 2 juin Mildiou : lire 28/5 au lieu de 21/5.

L'Ingénieur et le Technicien

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux, R. SARRAZIN.

chargés des Avertissements Agricoles,

H. SIMON et R. MERLING. Imprimerie de la Station de la Région Parisienne - Directeur-Gérant : L. BOUYX. 47, Av. Paul Doumer - 93 - MONTREUIL-SOUS-BOIS.